Lue le 6 juillet 1775

№ 117.

Observation

Par m. Jossard, chirurgien Gagnant maitrise à la charité.

Le mardi vingt sept juin on amena, à la charité, un broetteur qui avoit reçu, d'un neigre, un coup de bûche sur le côté droit de la tête. il tomba à terre du coup perdit connoissance; rendit du sang par le nez. la perte de connoissance, de mouvement arrivée à l'instant du coup, furent les seuls effets qui parurent. cet homme, avec ces accidents, ne survécu que trois heures au coup.

le lendemain j'examinai la tête. il n'y avoit de lesion apparente, qu'une plaie contuse, sur le parietal droit à l'endroit, percute. les teguments enlevés, le crane a, decouvert. le parietal droit étoit fracturé, vers son bord anterieur, cette fracture dans

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
ARC45 n°43

ecartement, ni enfoncement est curviligne.
elle tient en devant à la suture, ses
extremités s'y perdent, la superieure s'y
rend à peu de distance de la suture sagittale.
depuis cet endroit, est un ecartement de la
suture qui, unit le reste du bord anterieur
du parietal droit, et celui du parietal gauche:
jusqu'a l'endroit de la suture coronale, ou
la lame externe du bord anterieur du parietal
est la plus avancée. a cet endroit se voit
une fracture qui, comprend une portion de
l'angle anterieur et inferieure de le parietal
gauche, la quelle, tient en devant à la
suture coronal. ce même parietal presente
au dessus de la suture ecailleuse, une piece
fracturée totalement separée. du bord
superieur de ce trait de division, s'éleve une
fente qui, se porte sur le parietal, et regne
sur la table externe. d'un trait commun
de division se porte, transversalement en
devant sur la portion gauche du coronal une

fracture qui, se perd à la bosse de ce côté;
de ce même trait commun, en descend une
sur la portion ecailleuse du temporal
gauche; elle est triangulaire, son angle est
dans la cavité glenoïde de ce temporal
gauche, son bord posterieur remonte sur la
portion ecailleuse, en traverse la suture,
se perd sur le parietal. —
le cour ou la marche de la fracture a
la baze du crane est telle, qu'après avoir
divisé la cavité ~~glenoïde~~ du temporal
gauche, elle divise l'apophise epineuse
du sphenoïde de ce coté, la fracture
se continuant ~~fracture~~ en divise la grande ~~du~~
aile, mais pas en totalité, puis gagne le
corps de cet os qu'elle divise, derriere les
apophises clinoïdes anterieurs; puis traverse
la grande aile du côté droit, et se perd
dans l'endroit d'union de cette aile avec
le coronal. —
du coté gauche, entre le crane et la dure
mere, du sang epanché, et de plus infiltré
dans le muscle crotaphite de ce coté. —

du côté droit, ou du côté du coup,
beaucoup de sang épanché, entre la
dure mère et la pie mère, sur
tout l'hemisphere de ce côté, et même
sur le côté de la base du crane —
de plus les ventricules lateraux remplis
d'une serosité sanguinolente. Les
vaisseaux du cerveau ont été trouvés
très pleins —